

ESPÈCES INÉDITES

DE LA

TRIBU DES HISPIDES

par le docteur **Félicien Chapuis**

— SÉANCE DU 6 JANVIER 1877 —

DEUXIÈME PARTIE.

GENRE **MONOCHIRUS** Chp.

Genera des Coléoptères. T. XI, p. 330.

I. *Elytrorum disco nec tuberculoso nec spinulato.*

1. **M. inermis** Zubkoff. Darghestan.

Elongatus, opacus, ater; pronoto longitudine paulo latiori, tenuiter et densissime punctato-ruguloso, juxta marginem anticum transverse striolato, pilis nonnullis appressis argenteis adperso, transverse late et leviter bisulcato; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis alternis 1, 3, 5, 7 subelevatis; versus apicem irregulariter tuberculatis vel nodosis; marginibus sat dense spinulatis, spinulis lateralibus brevibus, apicalibus longioribus. Long. 5 mill.

II. *Elytrorum disco tuberculoso.*

2. **M. australicus** Motschulsky.

3. **M. fimbriatus** N. sp. Tasmanie.

Elongatus, ater, elytris nigro-cæruleis; fronte carinata; pronoto longitudini æquilato, versus apicem rotundato-angustato, ante basin subconstricto, densissime punctulato, breviter canaliculato, pilis brevibus flavis, appressis sparsuto, disco antico lævi, glabro, postice transverse sulcato, sulco profundo, basi parallelo, in medio transverse subimpresso; elytris elongatis, apice rotundatis, margine toto spinulatis, subregulariter punctato-striatis; humeris

elevatis, spinulis 4 vel 5 brevioribus seriatim armatis; disco tuberculis conicis, versus apicem majoribus obsito; femoribus anticis subtus spinulatis. Long. 6 mill.

III. *Elytrorum disco spinulato.*

4. **M. multispinosus** Germar.

5. **M. Germari.** Sp. n. Carpentaria.

Oblongus, ater, elytris nigro-cæruleis; fronte subcarinata; pronoto maxima latitudine paulo breviori, lateribus medio dilatato-rotundatis, versus basin leviter, versus apicem magis angustato; tenuiter rugoso-punctato, pilis flavis appressis obsito, linea media longitudinali lævi, subcanaliculata, transverse bi-impresso; elytris oblongis, apice rotundatis, punctato-striatis, margine et disco spinulatis, spinulis marginalibus paulo longioribus; femoribus anticis medio spinula sat longa subtus armatis. L. 4 mm.

6. **M. coarctatus.** Sp. n. Sydney.

Oblongus, ater, subnitidus; fronte subcarinata; pronoto paulisper longiori quam latiori, basi coarctato, versus apicem angustato, subtiliter irregulariterque ruguloso-punctato, pilis brevibus albidis obsito, linea media longitudinali sublævi, subcanaliculata, disco transverse bisulcato, sulcis subæquè impressis, angulis posticis acute dentatis; elytris oblongis, apice rotundatis, punctato-striatis, spinulatis, spinulis marginis et disci longitudine æqualibus; femoribus anticis breviter subtus bi- vel trispinulatis. Long. 4 mm.

7. **M. callicanthus.** Bates.

GENRE **PRIONISPA** Chp.

Genera des Coléopt. T. XI, p. 337.

1. **P. fulvicollis.** Guérin-Mén.

P. nitida Chp. Gen. Coleop. T. XI, p. 338.

2. **P. subopaca.** Chp.

GENRE **PLATYPRIA** Guér.-Mén.

Genera des Coléopt. T. XI, p. 336.

1. *Antennis tenuibus, capite et pronoto simul sumptis duplo longioribus.*

A. *Elytrorum margine lobis duobus ornato.* (Species ex Asia.)

1. **P. echidna** Guér.-Mén.

2. **P. hystrix** Fabr.3. **P. subopaca** Chp.4. **P. longispina** Chp.5. **P. dimidiata** Sp. n. Malacca.

Breviter oblonga, rufo-ferruginea; antennis nigris, apice subfuscis; pronoto transverso, opaco, basi sulcato, sulco vix distincte punctato, lateribus anticis lobatis, lobo 6-spinato, spinis quatuor majoribus et apice nigris; angulis posticis dente recurvo armatis; elytris subquadratis, profunde irregulariter punctato-striatis, nigris, tertia basali parte rufo-ferruginea; lobo antico nigro rufoque variegato, spinulis 4 longis et nigris armato; lobo postico bispinato; margine inter lobos breviter unispinato; margine apicali spinulato, spinulis longitudine abrupte decrescentibus; disco spinulis 7 vel 8 longioribus ornato. Long. 7 mm.

A'. Elytrorum margine lobo antico ornato. (Species ex Africa.)

6. **P. coronata** Guér.-Mén.7. **P. Raffrayi**. Sp. n. Zanzibar.

Breviter oblonga, subnitida, flava; antennis flavo-rufescentibus; pronoto subtransverso, opaco, ruguloso, transverse leviter bisulcato, flavo-ferrugineo cum maculis quatuor obscuris, interdum obsoletis; lateribus anticis lobatis, lobo 6-spinato, spinulis 4 majoribus et apice fuscis; scutello brunneo; elytris subquadratis, irregulariter et profunde punctato-striatis, flavis; lobo 4-spinato, spinula pone lobum longiori, flava, cum apice summo fusco, spinulis apicalibus leniter longitudine decrescentibus; spinulis discoïdalibus validis, sat numerosis; spinulis marginis et disci, una excepta, rufescentibus et apice plus minusve fuscis. Long. 5 mm.

8. **P. centetes**. Guér.-Mén.9. **P. luctuosa**. Sp. n. Calabar.

Breviter oblonga, subopaca, subtus flavo-ferruginea, supra nigra; antennis flavo-ferrugineis, articulis duobus primis fuscis, pronoto transverso, opaco, parce punctulato, transverse bisulcato, sulco antico subobsoleto, postico profunde, dense punctato; latere utroque antico lobato, lobo 6-spinato, cum margine antico et spinulis duabus primis pallide fuscis, lineola media longitudinali rufescente, sublævi; elytris subquadratis, mediocriter punctato-striatis, cum margine laterali et apicali tenue pallide fuscis, spinulis omnibus nigris, lobo 4-spinato; spinulis apicalibus abrupte longitudine decrescentibus. Long. 4 mm.

10. **P. abdominalis**. Sp. n. Madagascar.

Oblonga, atra, subopaca; antennarum articulis ultimis pilis griseis obsitis; pronoto transverso, tenuissime undulato-striolato, opaco, margine basali trisinuato, subtoruloso; linea media sublævi; lateribus anterieus lobatis, lobo elongato, 6-spinato, spinulis 4 longissimis, 2 brevissimis; elytris subquadratis, profundius punctato-striatis, spinulis marginis et disci acute longissimis; lobo trispinato; spinula pone lobum longissima, aliis sequentibus longitudine decreascentibus; corpore subtus nigro, abdomine rufescente. Long. 6 mm.

11. *Antennis sat validis, capitis et pronoti longitudini æqualibus.*

11. **P. erinaceus**. Fabr.

GENRE **HISPA**. Linnée.

Genera des Coléopt. T. XI, p. 333.

SUBGENUS **Thoracispa**.

1. **H. Dregei**. Dej. N. Sp. Afric. austr.

Obovata, opaca, nigro-fusca; pronoto subtransverso, lateribus et margine antico confusis, disco inæquali, subconcavo, parcius irregulariter punctato, pilis nonnullis appressis flavis adperso, disco medio breviter carinato, angulis posticis acute productis, utroque latere anterieus lobato, lobo basi constricto, rotundato, paulisper concavo, spinulis gracilibus, longis, circiter viginti, radiatim ornato, spinulis anticis supra caput subcancellatis; elytris subdepressis, regulariter punctato-striatis, margine ab humero ad apicem, serieque ab humero oblique ad medium ducta spinulis hinc et inde orientibus; femorum apice, tibiis et tarsis rufo-fuscis. Long. 5 mm.

SUBGENUS **Hispella**.

1. *Antennarum articulo uno basali spinato.*

2. **H. sulcicollis**. Gyll.3. **H. incerta**. Sp. n. Afric. occid.

Oblonga, opaca, nigra, elytris nigro-cœruleis, nitidulis; antennarum articulis 5 ultimis griseo-sericeis; pronoto transverso, rude, densissime et æqualiter ruguloso-punctato, basi transverse subsulcato; margine antico spinula bifurcata utrinque ornato, margine utroque laterali trispinato, spinulis duabus primis basi confusis; elytris oblongis, punctato-striatis, spinulis marginalibus et discoïdalibus subæqualibus numerosis. Long. 3 1/2 mm.

II. *Antennarum articulis nonnullis basalibus spinatis.*4. **H. bellicosa.** Guér.-Mén.5. **H. ceylonica,** Mots.6. **H. atra.** Linn.7. **H. cariosa.** Reiche.8. **H. stygia.** Sp. n. Ind. or.

Oblonga, opaca, atra; antennarum articulis sex spinulatis, spinula prima 4-fida, secunda bifida, aliorum spinula simplici; pronoto transverso, rude, densissime tenuiter ruguloso-punctato, transverse bisulcato, margine antico spinula bifurcata utrinque armato; margine utroque laterali trispinato, spinulis duabus primis basi connexis; elytris oblongis, subnitidis, mediocriter punctato-striatis, margine laterali ab humero ad apicem sat dense spinulato; disco spinulis et tuberculis conicis, acutis obsito; pedibus subrufescentibus, femoribus anticis subtus brevissime spinulatis, tibiis mediis curvatis. Long. 4 mm.

SUBGENUS **Podispa.**9. **H. spinulosa.** Gyll.10. **H. armata.** Guér.-Mén.SUBGENUS **Hispa.**I. *Antico pronoti margine inermi.*A. *Pronoto distincte pubescente.*11. **H. testacea.** Linn.12. **H. algeriana.** Guér.-Mén.13. **H. numida.** Guér.-Mén.14. **H. occator.** Brullé.15. **H. capensis.** Thunberg. Cap. bon. Spei.

Oblonga, subnitida, rufo-testacea; antennarum articulis duobus primis fuscis; pronoto subtransverso, subtiliter et parce punctato, pilis aureis appressis obsito, basi transverse sulcato, antico utroque latere lobato, lobo parvulo 7-spinulato, spinulis fuscis, anticis 5 magnis, æqualibus; duabus posticis basi connexis; elytris oblongis, punctato-striatis, pilis flavescentibus mollibus parcius vestitis, spinulatis, spinulis fuscis, longioribus, numerosis, inæqualibus; corpore subtus brunneo, pedibus flavo-ferrugineis. Long. 3 1/2 mm.

16. **H. pallescens.** Guér-Mén.17. **H. subhirta.** Sp. n. Madagascar.

Oblonga, opaca, nigro-fusca; capitis antica parte rufescente; pronoto longitudine paulo latiori, subtiliter ruguloso-punctato, pilis flavo-sericeis parce obsito, medio breviter canaliculato, utroque latere anterieus lobato, lobo parvo, 6-spinulato, spinula postica breviori, antica suberecta, introrsum inclinata; elytris oblongis, irregulariter, parum profunde punctato-striatis, pilis mollibus, suberectis parce vestitis, spinulatis, spinulis marginalibus sublongioribus; discoïdalibus inæqualibus; pedibus rufo-ferrugineis, femorum basi obscure fusca. Long. 5 mm.

A. Pronoto glabro vel parcissime piloso.

18. **H. armigera.** Oliv.19. **H. Fabricii.** Guér.-Mén.20. **H. dama.** Sp. n. Ind. or.

Lata, oblonga, opaca, nigro-cyanea, abdomine rufo; pronoto longitudine paulo latiori, transverse bisulcato, rude, indistincte punctulato, latere utroque antico lobato, lobo 10-spinulato, spinula prima supera, introrsum obliqua, spinulis tribus posticis brevibus, basi connexis; elytris oblongo-subquadratis, profunde et dense, parum regulariter punctato-striatis, spinulatis; spinulis discoïdalibus robustis, longioribus, inæqualibus; marginalibus alternatim longioribus et brevioribus gracilibusque. Long. 6 mm.

21. **H. alternata.** Sp. n. Java.

Oblonga, subnitida, rufo-brunnea, æneo leviter induta; pronoto longitudine paulo latiori, irregulariter parum profunde punctato, transverse bisulcato, linea longitudinali media lævi, subnitida, irregulari; utroque latere lobato et spinulato, lobo 4-spinulato, spinula pone lobum breviori; elytris oblongis, subnitidis, medio-criter punctato-striatis, spinulatis, spinulis discoïdalibus valde inæqualibus, marginalibus longioribus, longitudine alternatis; pedibus pallide brunneis. Long. 4 mm.

22. **H. quadrifida.** Gerst.

? **Var.** Pedibus rufescentibus. India.

23. **H. torulosa.** Sp. n. Cafrerie.

Oblonga, opaca, atra; pronoto longitudini fere æquilato, versus apicem leviter angustato, opaco, disco medio breviter canaliculato, basi transverse sulcato, margine basali toruloso, torulo utrinque versus basin ramusculi producto; lateribus 5-spinatis, spinis

4 anticis e ramusculo brevi, tereti, cruciatim orientibus, spina postica breviori, simplici; elytris oblongis, subnitidis, profunde et irregulariter punctato-striatis, multispinosis; spinulis discoïdalis, inæqualibus; spinulis marginalibus longitudine regulariter alternatis. Long. 5 mm.

24. **H. ramulosa.** Sp. n. Cafrerie.

Oblonga, parvula, opaca, atra; pronoto longitudini æquilato, rude, tenuiter ruguloso, disco antico læviusculo, versus basin leviter et late depresso, in utroque latere ramulo spinulato ornato, spinula parva, bifurcata a basi ramuli orta, extus spinulis 5 longioribus, tenuibus, subflexuosis, antica intus spinulas tres arcuatas emittente; elytris oblongis, punctato-striatis, longius spinulatis, spinulis marginalibus longitudine valde alternantibus. Long. vix 3 mm.

25. **H. Gestroi.** Sp. n. Madag.

Oblonga, atra, subopaca; pronoto longitudini æquilato, versus basin subconstricto et supra subsulcato, subopaco, disco medio distincte longitudinaliter sulcato et utrinque punctis nonnullis impresso; utroque latere 5-spinulato, spinulis 4 anticis basi conjunctis, quinta simplici, postica; elytris oblongis, subnitidis regulariter punctato-striatis, parcius spinulatis; spinulis marginis, circiter 8, paulo longioribus; spinulis disci, circiter 11. Long. 4 mm.

26. **H. longespinosa.** Fairm.

II. *Pronoti margine antico spinulato.*

B. *Pronoto distincte, interdum parcius piloso.*

C. *Spinulis pronoti appendiculatis vel setiferis.*

27. **H. spinosa.** Weber.

28. **H. nigripennis.** Mots.

29. **H. vanikorensis.** Mots.

30. **H. pallidipennis.** Mots.

31. **H. puberula.** Chp.

32. **H. ramuligera.** Sp. n. Malacca.

Oblonga, subnitida, brunnea; antennarum articulis duobus primis nigro-fuscis; pronoto transverso, tenuiter et dense undique ruguloso-punctato, transverse bisulcato, linea longitudinali media anguste carinata; margine antico utrinque 2-spinulato, spinulis basi conjunctis et ante apicem bifurcatis; margine utroque laterali

4-spinato, spinulis tribus basi conjunctis, duabus anticis longioribus, in medio longitudinis et ante apicem bifurcatis vel appendiculatis, tertia simplici, multo breviori, quarta libera postica, præcedente dimidio breviori; spinulis prothoracis rufis cum apice summo fusco; elytris oblongis, nigris, irregulariter et profunde punctato-striatis, longius spinulatis; spinulis marginalibus longitudine valde alternantibus; pedibus ferrugineis. Long. 4 mm.

33. **H. discoïdalis**. Sp. n. Celebes.

Oblonga, subnitida, rufo-ferruginea; pronoto transverso, utrinque medio rotundato-dilatato, densius et fortiter punctato, parce flavo-piloso, transverse leviter bisulcato, plaga transversa, impunctata subelevata, discoïdali; margine antico utrinque spinula bifurcata armato; margine utroque laterali subtrispinato, spinula antica bifurcata, postica breviori, simplici cum antica basi subconnexa; elytris oblongis, profunde et irregulariter punctato-striatis, nigro-cœruleis cum apice rufo-ferrugineo, sat longe spinulatis, spinulis disci circiter 10, spinulis marginalibus longitudine valde alternantibus; pedibus flavo-ferrugineis. Long. 4 1/2 mm.

34. **H. setifera**. Sp. n. Batchian.

Oblonga, subnitida, rufo-ferruginea; pronoto transverso, lateribus producto-rotundatis, densissime parum profunde punctato, transverse bisulcato, sulcis versus latera arcuatim connexis, disco medio transverse elevato, impunctato; margine antico utrinque spinato, spinula valida, bifurcata; margine utroque laterali 3-spinato, spinulis duabus anticis basi conjunctis, tertia postica, multo breviori, libera; spinulis prothoracis appendiculatis et setiferis, basi excepta, fuscis; elytris oblongis, cum spinulis nigro-cœruleis, profunde punctato-striatis, punctis pilo decumbente albido ornatis; spinulis subarcuatis, marginalibus paulo longioribus, cum tuberculis longe setiferis alternantibus. Long. 5 mm.

35. **H. insignita**. Sp. n. Ceylan.

Oblonga, subnitida, flavo-cinnamomea; antennis tenuibus, vix corpore brevioribus, articulis duobus primis et ultimis 5 fuscis; pronoto longitudine fere duplo latiori, transverse bisulcato, maculis duabus disci magnis, densius punctatis, nigris; linea media longitudinali canaliculata; margine antico utrinque bi-spinulato, spinula antica ante apicem bifurcata, spinula postica bidenticulata; margine utroque laterali 3-spinato, spinulis duobus anticis longis, bidenticulatis, tertia postica brevissima, simplici; spinulis prothoracis flavis cum apice et denticulis fuscis; elytris oblongis, medio-criter punctato-striatis, parce pilosis, sat longe spinulatis; spinulis

disci nigro-fuscis; spinulis marginis, 3 vel 4 exceptis, flavis; pectoris lateribus nigro-vittatis. Long. 3 1/2 mm.

C'. Spinulis pronoti simplicibus.

36. **H. trifida.** Sp. n. Malacca.

Oblonga, subnitida, atra; pronoto transverso, apice angustato, tranverse sat fortiter bisulcato, parce piloso, irregulariter punctulato, disco medio sublævi, breviter canaliculato; margine antico utrinque bispinulato, spinulis basi connexis; margine utroque laterali 3-spinato, spinulis basi connexis; postica longiori; elytris oblongis, punctato-striatis, pilis mollibus, suberectis, raris vestitis; sat longe spinulatis, spinulis marginalibus longitudine valde alternantibus. Long. 4 mm.

37. **H. vittula.** Chp.

38. **H. Perroteti.** Guér.-Mén.

39. **H. Leonardi.** Rits.

40. **H. echinata.** Gyll.

41. **H. Ritsemæ.** Sp. n. Madagascar.

Oblonga, parvula, subopaca, nigra; pronoto transverso, parce et subtiliter punctulato, parce flavo-piloso, transverse bisulcato, obsolete longitudinaliter canaliculato, disco inter sulcos paulisper elevato, sublævi, glabro; margine antico utrinque bispinato, spinulis basi connexis, utroque latere 3-spinato, spinulis duabus anticis basi connexis, tertia postica longiori; elytris subtiliter punctato-striatis, punctis piliferis, pilis flavis, appressis; spinulis in margine circiter 8, in disco circiter 13. Long. vix 3 mm.

42. **H. æneicolor.** Fairm.

43. **H. pubicollis.** Sp. n. Cap. Bon. Spei.

Oblonga, subnitida, flavo-ferruginea; antennarum articulis duabus primis fuscis; pronoto transverso, apice angustato, undique sat dense flavo-sericeo, in medio longitudinaliter a basi ad apicem sulcato, transverse leviter bisulcato, margine antico utrinque spinato, spinula prope basin bifurcata; margine utroque laterali 3-spinato, spinulis duabus anticis æqualibus, basi subconjunctis, tertia postica, multo breviori, simplici, ab aliis paulisper remota; elytris oblongis, profunde punctato-striatis, spinulatis, spinulis discoïdalibus, basi crassis, nigro-fuscis; spinulis marginalibus sublongioribus, flavis cum apice plus minusve infuscato. Long. 4 1/2 mm.

44. *H. mamillata*. Sp. n. Cap. Bon. Spei.

Oblonga, subnitida, rufo-brunnea vel fusca; antennis brevioribus, crassiusculis, pronoto transverso, basi apiceque angustato, parce et subtiliter punctato pilosque, disco medio utrinque verruca rotundata, subdepressa, glabra, subimpunctata ornato; margine antico utrinque bispinato, spinulis basi conjunctis; margine laterali medio trispinato, spinulis subæqualibus, breviusculis, distinctis, simplicibus; elytris oblongis profunde punctato-striatis, disco tuberculatis, margine spinulatis; tuberculis conicis, acutis, validis, apice fuscis; spinulis brevibus, versus apicem dentiformibus; prosterno, pectore et maculis in utroque abdominis latere nigropiceis. Long. 4 1/2 mm.

45. *H. tenuicornis*. Sp. n. Cafraria.

Oblonga, subnitida, fusca; antennis tenuibus, longioribus, ferrugineis, articulis duobus primis rufo-fuscis; prosterno transverso, sat dense et fortiter punctato, parce piloso, transverse bisulcato, sulcis versus latera confusis, disco medio toruloso; margine antico utrinque spinulato, spinula bifurcata flava, apice fusca; margine utroque laterali trispinato, spinulis flavis, apice fuscis, duabus anticis basi conjunctis, tertia simplici, dimidio breviori; elytris oblongo-subquadratis, sat profunde punctato-striatis, fuscis, lineisque longitudinalibus angustis inter spinulas rufescentibus ornatis, fusco-spinulatis; spinulis marginis lateralis flavo-ferrugineis, basi et apice breviter infuscatis; pedibus flavis. Long. 3 1/2 mm.

46. *H. Clementis*. Sp. n.

Oblonga, opaca, sordide flavo-brunnea; antennis tenuibus, rufo-brunneis; pronoto transverso, sat dense punctato et piloso, transverse bisulcato, linea longitudinali media carinulata, basi apiceque abbreviata; margine antico utrinque spinulato, spinula versus basin bifurcata; margine utroque laterali trispinato, spinulis anticis duabus basi connexis, tertia simplici, dimidio longiori; spinulis prothoracis flavis cum apice summo fusco; elytris oblongis, profunde punctato-striatis, sat dense flavo-pilosis, interstitiis alternis subcarinatis, sordide flavis cum plagis nonnullis et spinulis disci fuscis; spinulis marginis flavis, exceptis 3 vel 4 fuscis ad angulum laterali-posticum positis. Long. 4 1/2 mm.

47. *H. brevispinosa*. Sp. n. Ind. or.

Oblonga, subnitida, atra; pronoto transverso, undique densius et parum profunde punctato, punctis breviter piliferis, transverse bisulcato; margine antico utrinque spinato, spinula bifurcata; margine utroque laterali bi-spinato, spinula antica versus basin bifurcata, spinula postica libera, dimidio breviori; elytris oblongis,

dense et profunde punctato-striatis, punctis capillo brevi, decumbente, vix distincto ornatis; disco parce tuberculato-spinato, margine breviter spinato. Long. 4 1/2 mm.

B'. *Pronoto glabro.*

D. *Spinulis pronoti appendiculatis vel setiferis.*

48. **H. cladophora.** Guér.-Mén.

49. **H. bipartita.** Guér.-Mén.

D'. *Spinulis pronoti simplicibus.*

50. **H. sulcata.** Sp. n.

Oblonga, opaca, atra; pronoto transverso, rude sulco basali punctato, profundo, utrinque arcuatim antrorsum producto, linea longitudinali media antierius canaliculata, posterius oblongo-foveolata; margine antico utrinque bispinato, spinula antica recta, postica arcuata, antrorsum recurva; margine utroque laterali trispinato, spinulis basi connexis, duabus posticis sublongioribus, arcuatis; elytris oblongis, profunde et irregulariter punctato-striatis, punctis albo-setiferis; disco tuberculato-spinoso; spinulis marginalibus sat numerosis, ab humero ad angulum satutalem subæqualibus. Long. 4 mm.

51. **H. apicata.** Fairm.

52. **H. infuscata.** Chp.

53. **H. palliata.** Chp.

54. **H. laticollis.** Sp. n. Afric. occid.

Oblonga, subnitida, rufo-ferruginea; pronoto fortiter transverso, sat dense parum profunde punctato, subtiliter canaliculato, transverse bisulcato, sulcis impressis, versus latera conjunctis; margine antico utrinque spinato, spinula bifurcata; margine utroque laterali 5-spinato, spinis 4 basi conjunctis, tribus anticis longioribus, quarta brevissima, quinta libera, longitudine præcedentis; elytris oblongis, profunde et irregulariter punctato-striatis; spinulis fulvis cum apice fusco, in disco numerosis, aliis longioribus, aliis brevioribus intermixtis; in margine longitudine valde alternantibus. Long. 4 1/2 mm.

